

服用に際しては、この説明文をよく読むこと。

ネオグロンビター内服液
(滋養強壮薬)

使用上の注意【相談すること】1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者または登録販売者に相談すること／**皮ふ**：発疹／**消化器**：胃部不快感・下痢2.しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること **成分・分量** 1日量(30mL)中ゴオウチンキ0.1mL(原生薬換算量2mg)、ニンジンエキス41mg(原生薬換算量610.9mg)、タウリン1,000mg、チアミン硝化物(ビタミンB₁)10mg、リポフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB₂)5mg、ニコチン酸アミド25mg、オロチン酸60mg、L-リジン塩酸塩100mg、無水カフェイン50mg 添加物：液糖、D-ソルビトール、クエン酸、L-グルタミン酸Na、安息香酸Na、パラベン、エタノール、香料(バニリン)(アルコール0.3mL以下)



アンプル:PP
ラベル:PET
ストロー袋:PP

発熱性消耗性疾患時の
栄養補給

ネオグロンビター
内服液

滋養強壮・虚弱体質

第3類医薬品



30mL

常盤薬品
NOEVIR GROUP

●ビタミンB₂により尿が黄色くなる
ことがある。効能・効果 ○滋養強壮○虚弱体質○肉体的疲労・病後の体力低下・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給 用法・用量 成人(15才以上)1日1回、1本(30mL)を服用すること。<用法・用量に
関連する注意>(1)内服にのみ使用する
こと。(2)用法・用量を守る
こと。(3)服用時にはアンプルの頸部を折
り、添付のストローで吸飲すること。保管および取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手のとどかない所に保管すること。(3)他の容器に入れがえないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)期限を過ぎた製品は服用しないこと。(5)生薬を含むため、まれに混濁を生じることがありますが、服用には支障はありません。

常盤薬品工業株式会社
NOEVIR GROUP

本社
神戸市中央区港島中町6-13-1
製造販売元
三重県伊賀市白檜字永谷2604-5

お問い合わせは
0120-875-710まで
副作用被害救済制度
0120-149-931

500円(税別) FSF301

使用
期限
製造
番号