

服用に際しては、この説明文をよく読むこと。

ピタシーゴールドD(ビタミン含有保健剤)  
使用上の注意(相談すること) 1.服用後、次の症状  
があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直  
ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師ま  
たは登録販売者に相談すること/皮ふ:発疹/消  
化器:吐き気・嘔吐・胃部不快感 2.服用後、次の  
症状があらわれたことがあるので、このような症状  
の持続または増強がみられた場合には、服用を中止  
し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者  
に相談すること/軟便、下痢 3.しばらく服用して  
も症状がよくなる場合は服用を中止し、この製  
品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談す  
ること 成分・分量 1日量(50mL)中 ペンフォ  
チアミン(ビタミンB1誘導体)10mg、リポフラビリン  
酸エステルナトリウム(ビタミンB2)10mg、ピロキ  
シン塩酸塩(ビタミンB6)10mg、ニコチン酸アミド  
60mg、無水カフェイン50mg、タウリン1,500mg、オ  
キソアミチン末100mg、イノシール300mg、カルニ  
チン塩化物100mg、ローヤルゼリーチンキ300mg  
(生ローヤルゼリーとして300mg)、人参乾燥エキス  
40.3mg(原生薬換算量600mg)、ジョテイシエキス  
75mg(原生薬換算量300mg)、セイヨウサンザシエ  
キス17.5mg(原生薬換算量70mg)、クコン流エキス  
0.2mL(原生薬換算量200mg)、ブクリョウエキス10  
mg(原生薬換算量320mg)、トシエキス10mg(原  
生薬換算量100mg) 添加物:液糖、D-ソルビトール、  
ハチミツ、pH調整剤(クエン酸)、香料(エタノール、  
デンブ部分加水分解物、バニリン、l-メントール)  
(アルコール0.5mL以下)●ビタミンB2により尿が  
黄色くなることもある。

防腐剤無添加

50mL

指定医薬部外品

常盤薬品  
NOEVIR GROUP

滋養強壮・栄養補給

ピタシー  
ゴールド<sup>D</sup>

有効成分 16 種 配合

タウリン 1500mg  
ニンニク配合

効能・効果 ○滋養強壮○  
虚弱体質○肉体的疲労・病中  
病後・食欲不振・栄養障害・  
発熱性消耗性疾患・妊娠授  
乳期などの場合の栄養補給  
用法・用量 成人(15才以  
上)1日1回、1びん(50mL)  
を服用すること。●用法・用  
量を守る。●用法・用  
量を守る。(他のピタミ  
ンなどを含有する製品を同  
時に使用する場合には過剰  
摂取などに注意すること。)  
保管および取扱い上の注意  
(1)直射日光の当たらない  
涼しい所に保管すること。

(2)小児の手のとどかない所に保管すること。(3)他  
の容器に入れかえないこと。(服用の原因になったり  
品質が変わる。)(4)期限を過ぎた製品は服用しないこと。  
(5)生薬を含むため、まれに混濁を生じることがありますが、  
服用には支障はありません。

常盤薬品工業株式会社  
NOEVIR GROUP

本社 神戸市中央区港島中町6-13-1  
製造販売元 三重県伊賀市白檜字永谷2604-5

お問い合わせは  
0120-875-710まで  
www.tokiwayakuhin.co.jp

017070  
金属:キャップ ガラス:びん TNB903

使用期限

製造番号

