

服用に際しては、この説明文をよく読むこと。
ビタシーローヤル3000ZERO(滋養強壮薬)
使用上の注意[相談すること] 1.服用後、次の症
状があらわれた場合は副作用の可能性があるの
で、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬
剤師または登録販売者に相談すること／皮膚：発
疹／消化器：吐き気・嘔吐・胃部不快感 2.服用後、
次の症状があらわれることがあるので、このような
症状の持続または増強がみられた場合には、服用
を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登
録販売者に相談すること／軟便、下痢 3.しばらく
服用しても症状がよくなる場合は服用を中止
し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販
売者に相談すること **成分・分量** 1日量(100mL)
中 ペンフォチアミン(ビタミンB₁誘導体)10mg、リ
ボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB₂)
12mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)15mg、ニ
コチン酸アミド60mg、タウリン3,000mg、アスパ
ラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物200mg、
ローヤルゼリーチンキ100mg 添加物：還元麦芽
糖水アメ、アセスルファムK、スクラロース、pH調
節剤(クエン酸)、安息香酸Na、香料(エタノール、バ
ニリン)(アルコール0.2mL以下)
●ビタミンB₂により尿が黄色くなることがある。
効能・効果 ○滋養強壮○虚弱体質○肉体疲労・
病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性
疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

常盤薬品
NOEVIR GROUP

第3類医薬品

滋養強壮・栄養補給

ビタシーローヤル
3000
ZERO
糖類ゼロ

ハンカフェイン
タウリン3000mg配合
ローヤルゼリー配合

用法・用量 成人(15才以上)
1日1回、1びん(100mL)を服
用すること。●用法・用量を
守ること。保管および取扱
い上の注意 (1)直射日光の
当たらない涼しい所に保管す
ること。(2)小児の手のとどか
ない所に保管すること。(3)他
の容器に入れかえないこと。
(誤用の原因になったり品質
が変わる。)(4)期限を過ぎた
製品は服用しないこと。(5)生
薬を含むため、まれに混濁を
生じることがありますが、服
用には支障はありません。

常盤薬品工業株式会社
NOEVIR GROUP

本社 神戸市中央区港島中町6-13-1
製造販売元 三重県伊賀市白檜字永谷2604-5
お問い合わせは 0120-875-710まで
www.tokiwayakuhin.co.jp
副作用被害救済制度
0120-149-931

金属：キャップ 使用期限
ガラス：びん

100mL 製造番号
16kcal (1本あたり)



001320
ALC504